

أوتيل ديو دو فرانس
مركز طبي جامعي



الانقطاع عن الطعام
قبل العملية الجراحية

للبالغين

ما لم ينصحك طبيب التخدير بتعليمات أخرى

بإمكانك تناول السوائل الشفافة والمحلاة
قبل ساعتين من الجراحة

يسمح بشرب السوائل التالية:



■ ماء

■ عصير فواكه، صافٍ ومن دون لب: تفاح، عنب، توت بري

■ شاي، شاي الأعشاب أو قهوة سوداء
(Nescafé، قهوة مصفاة) من دون حليب أو كريمة

■ مشروبات رياضية:
(مثل: Gatorade ، Powerade)

يمنع شرب السوائل التالية:



■ عصير فواكه غير شفاف يحتوي على لب
(مثل: عصير البرتقال، أو عصير smoothie ...)

■ مشروبات غير شفافة
(مثل: بديل غذائي من نوع Ensure)

■ حليب وكريمة

■ مشروب غازي

■ مشروب منشط (مثل Red Bull ، Monster)

■ قهوة لبنانية

لمرضى السكري

ما لم ينصحك طبيب التخدير بتعليمات أخرى

يمكنك شرب السوائل الشفافة والمحلاة
حتى ساعتين قبل العملية

يسمح بشرب السوائل التالية:



■ ماء

■ شاي، شاي الأعشاب أو قهوة سوداء
(Nescafé، قهوة مصفاة) من دون حليب أو كريمة

يمنع شرب السوائل التالية:



■ عصير فواكه غير شفاف يحتوي على لب
(مثل: عصير البرتقال، أو عصير smoothie ...)

■ مشروبات غير شفافة
(مثل: بديل غذائي من نوع Ensure)

■ حليب وكريمة

■ مشروب غازي

■ مشروب منشط (مثل Red Bull ، Monster)

■ قهوة لبنانية

للأطفال

ما لم ينصحك طبيب التخدير بتعليمات أخرى

الانقطاع عن الطعام عند الأطفال قبل العملية الجراحية
في اليوم السابق للعملية
عشاء خفيف

يوم العملية

يُسمح بتناول السوائل الشفافة حتى ساعتين قبل العملية:



- ماء غير غازي
- شراب، عصير من دون لب
- زهورات مسموحة

يمنع شرب السوائل التالية:



- عصير فواكه غير شفاف يحتوي على لب (مثل: عصير البرتقال، أو عصير smoothie ...)
- مشروبات غير شفافة (مثل: بديل غذائي من نوع Ensure)
- حليب وكريمة
- مشروب غازي

العمر 6 أشهر

■ آخر وجبة طعام يجب إنهاؤها

قبل ست ساعات على الأقل من موعد العملية

(وجبة خفيفة، حليب، لبن، جبن أبيض،
خبز بالحليب، رقائق الذرة...)




العمر 6 أشهر

■ آخر وجبة طعام يجب إنهاؤها

قبل أربع ساعات على الأقل من موعد العملية

(حليب الأم أو الحليب الصناعي للمرحلة الأولى)





www.hdf.usj.edu.lb -     Hôtel-Dieu de France